

- 1 አገገርን በአግባቡ እና ሁል ጊዜ እንጠቀም
- 2 አገገራችንን በየአራት ወሩ አጥብን ጥሳ ሥር በማስጣት እንጠቀም
- 3 ትኩሳት፣ ራስ ምታትና የማንቀጥቀጥ ስሜት ካለን ፈጥን ወደ ህክምና መስጫ እንሂድ
- 4 የታዘዘልንን መድሃኒት በአግባቡ ጨርሰን እንወሰድ
- 5 ቤታችንን የፀረ-ወባ ትንኝ ኬሚካል እናስረጭ
- 6 የተረጨውን ግድግዳ እንሰስን ወይም በወረቀት እንሰጥፍ



የወባ መከላከያ ዘዴዎች



ወባን በጋራ ጨርሶ እናስወግድ 



1 አገበር መጠቀም

ሁሉም የቤተሰብ አባላት ለነፍሱ ጡሮቹ እና ዕድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት ቅድሚያ በመስጠት ዘወትር ምሽት በፀረ-ወባ ኬሚካል በተነከረ አገበር ውስጥ እንዲተኙ አድርጉ።

በመጥታ ጊዜ የአገበርን የታችኛውን ጫፍ ከፍራሹ ስር መወሸቁን አረጋግጡ።



2 አገበርን ማጠብ

የአልጋ አገበራቸውን በየአራት ወራት በልብስ ሳሙና አጠቡት። በጥላ ውስጥ በመስቀል ወይም በማስጣት እንዲደርቅ አድርጉት።



3 ህክምና ማግኘት

በማንኛውም ጊዜ የቤተሰብ አባላት የትኩሳት ስሜት ሲኖራቸው በፍጥነት በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው ጤና ተቋም ውሰዷቸው።



4 መድሃኒት መውሰድ

የፀረ-ወባ መድሃኒትን በጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ ወይም በህክምና ባለሙያ በታዘዘው መሰረት ሳያቋርጡ መውሰድ ያስፈልጋል።


መድሃኒቱን ማቋረጥ ወይም ለሌላ ሰው ማካፈል የለበትም።



5 የፀረ-ወባ ኬሚካል ማስረጨት

የፀረ-ወባ ኬሚካል በሚረጭባቸው ጊዜያት ኬሚካሉን ለሚረጨት ባለሙያዎች አስፈላጊውን ትብብር አድርጉ።

በመኖሪያ አካባቢ የሚገኙ ውሃ የሚይዙ እና ጥቅም የማይሰጡ ቁሳቁሶችን፣ ረገራጋማ ቦታዎችን ማፅዳት፣ ማፋሰስ ወይም ማዳፈን ያስፈልጋል።



6 ግድግዳውን እስመስሰን

የፀረ-ወባ ኬሚካል የተረጨውን ግድግዳ ለስድስት ወራት በአበትም ሆነ በጭቃ አትለቀልቁት፤ ወረቀትም አትለጥፉበት።